

Hipoacusia súbita neurosensorial

Dra. Elisabet Pace

Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires. 2021

El paciente refiere como síntomas más frecuentes la pérdida brusca de la audición acompañada por un molesto zumbido o acúfeno (tinnitus) en el oído afectado. Pueden aparecer también vértigo, mareos, náuseas y vómitos.

No se sabe a ciencia cierta sobre la causa exacta que la provoca, aunque muchas probables pueden desencadenarla, como infección viral cercana, alergia, estrés, episodio de espasmo vascular, trombosis, inmunidad, etc., lo que da origen a una inflamación del oído interno.

Los otorrinolaringólogos la tratan en principio con corticoides, vasodilatadores y complejos vitamínicos.

La función de la Cámara Hiperbárica es la de colaborar reduciendo el edema, mejorando la circulación, aumentando la oxigenación, regulando la respuesta inmune y disminuyendo los procesos infecciosos.

Para lograr un efecto beneficioso es ideal comenzar con las sesiones no más allá de los tres primeros meses, de evolución muy satisfactoria dentro de los quince días de haber sufrido la sordera, puesto que la respuesta es más efectiva dentro del tiempo comprendido en ese lapso, lo que no quita que existan quienes mejoran aún habiendo superado dicho período.